

DIARREE tijdens de KALVEROPFOK

1 VOORGESCHIEDENIS			2 DIAGNOSE		3 BEHANDELING	
Leeftijd	Mest	Mogelijke symptomen	Waarschijnlijke oorzaak	Wanneer frequent diarree: MESTONDERZOEK	Wat te doen?	Bedrijfsspecifieke behandeling
1 week	Dun, vlokkerig	(Zeer) ziek kalf, koorts, ondertemperatuur mogelijk, toestand kan snel verslechteren	E. Coli	Bevestiging via mestonderzoek (labo of sneltest) <ul style="list-style-type: none"> Bemonster zo snel mogelijk na ontstaan eerste symptomen diarree (Tip: indien bv. altijd diarree op dag 8, reeds op dag 7 stalname laten uitvoeren) Bemonster ten minste 5 dieren Bemonster nooit van de grond, altijd direct van het dier 	Contacteer dierenarts, vaak is een infuus nodig	<p>Door</p> <p>dierenarts</p> <p>in te vullen.</p>
1-3 weken	Gelig, vla-achtig	Kalf wat sloom, maar drinkt goed, geen koorts	Voedingsdiarree		Twee voedingen melk halveren, dan voorzichtig opvoeren	
7-14 dagen	Gelig, pasta tot vloeibaar	Kalf slap en hangerig, temperatuur tussen 38-39,5°C	Rota/ coronavirus		Elektrolyten als extra voerbeurt, melk door blijven voeren, medicatie	
2-3 weken	Wit-geel-groen, waterig, vaak met bloed	Eventueel symptomen van een bijkomende infectie	Cryptosporidium		Medicatie, evt. elektrolyten voeren	
Vanaf 4 ^{de} week	Bruingroen, dun, vaak met bloed	Kalf met dofte vacht, vermagert, perst op darm	Coccidiose		Medicatie, rantsoen controleren	
Vanaf 4 ^{de} week	Bruingrijs, kleiachtig, waterdun	Mager kalf met dikke klotsbuik	Pensdrinker/ kleischijter		Vroeg: pens leeg hevelen, kunstspeen Chronisch: kalf spenen	

PREVENTIE

- Biestmanagement
- Biest toedienen aan melk (150ml per keer)
- Vaccinatie moederdier



Immunititeit ↑



Infectiedruk/ belasting ↓



- Huisvesting en hygiëne: interne bioveiligheid, reinigen en ontsmetten (zie [reinen en ontsmetten van de kalverhuisvesting](#))
- Meer stro gebruiken
- Voeding:
 - Schoon en zorgvuldig werken bij voeren (T° melk, concentratie, (speen)emmer)
 - Extra voerbeurt