



LUCHTWEGAANDOENINGEN tijdens de KALVEROPFOK

< 10°C in de stal bij de kalveren?

















NEE  JA 

STANDAARDCONTROLE ADEMHALING



Tel het aantal ademhalingen gedurende **15 seconden**.

< 20 / 15s ✓ **> 20 / 15s** ✗

SCORESISTEEM SYMPTOMEN				
	0	1	2	3
A	Doorzichtige neusvloeï 	Overvloedige doorzichtige of 1 kant etterige neusvloeï 	Beiderzijds etterig of slijmerige neusvloeï 	Beiderzijds overvloedige etterige neusvloeï 
B	Geen hoest 	Enkelvoudige hoest 	Hoesten na voelen (zachtjes schudden) aan de luchtpijp, herhaaldelijk hoesten 	Spontaan herhaaldelijk hoesten 
C	< 38,5°C 	38,5 - 39,0 °C 	39,0 - 39,5°C 	> 39,5°C 
D	Alert, normaal 	Blijft langer liggen 	Niet alert, blijft liggen 	Weinig reactief, wil niet rechtstaan 

TOTALE SCORE

A + B + C + D = ...

< 4 ✓

4 Herevalueer bij volgend controlemoment

> 4 Standaardbedrijfsbehandelplan:

OF bel dierenarts:

Het scoresysteem is aangepast naar de BRD scorekaart van Faculteit Diergeneeskunde UGent.

PREVENTIE

Goed biestmanagement

zie [Biestmanagement tijdens de kalveropfok](#)



Controle huisvesting en stalklimaat

- Tocht, lichtsnelheid, luchtverversing (bv. rookproef)
- Beschuttingsmogelijkheden ("nest", kalverjasje <10°C)
- Goed instrooien (droog, poten bedekt bij neerliggen)
- Aparte huisvesting voor:
 - Kalveren jonger dan 2 maand
 - Kalveren tussen 2 en 6 maand
 - Dieren ouder dan 6 maand



Longspoeling/neusswab (veearts)

Aangepast vaccinatieschema: _____

